


El **cáncer cervicouterino** es una alteración celular que se manifiesta inicialmente a través de lesiones de lento desarrollo. **Es provocado por el Virus Papiloma Humano (VPH)**, el cual se transmite por contacto durante las relaciones sexuales.

Existen 120 tipos de HPV y aproximadamente 25 de éstos afectan al ser humano. La mayoría de las personas contrae este virus durante su vida y logra eliminarlo gracias a su sistema inmune. Un porcentaje menor es incapaz de eliminar el virus, desarrollando lesiones pre cancerosas en el cuello del útero y finalmente un cáncer invasor.



Factores que predisponen al cáncer cervicouterino



Infección por Virus Papiloma Humano.



Temprano inicio de la actividad sexual y multiplicidad de parejas.



Tabaquismo debilita el sistema inmune.

Gracias a la detección temprana que permite el PAP, las muertes por este tipo de cáncer han disminuido casi un 25% en los últimos 10 años.

Fuente: Deis, Minsal.

¿Cuándo y dónde realizarse exámenes?

- 1 El PAP se debe realizar a partir de los 21 años, independiente de si comenzó antes la actividad sexual.
- 2 El PAP se debe realizar cada 3 años, hasta los 65 años o más, dependiendo de la indicación médica.
- 3 La mujer tiene derecho a hacerse un PAP gratis cada 3 años, a través de su sistema de salud (Fonasa o Isapre).
- 4 La prueba de VPH no tiene cobertura de los sistemas de salud y se realiza en ciertos laboratorios y clínicas.

¿Hay pruebas que puedan prevenir o detectar el cáncer cervicouterino en etapas tempranas?

- El Papanicolaou (PAP) revela cambios en las células causados por la infección de VPH. Estos cambios pueden derivar en el desarrollo de cáncer cervicouterino.
- La prueba de VPH detecta si el VPH se incorporó al ADN de la persona, y por lo tanto se desarrollará cáncer.

Vacuna para el VPH

Las vacunas que protegen del HPV son dos. Una previene la infección de 4 tipos de virus papiloma (tipos 6, 11, 16, 18) y la segunda, de los tipos 16 y 18. Su uso está aprobado para mujeres de 9 a 26 años. Es más efectiva en niñas y mujeres que no han iniciado su actividad sexual.



A partir de 2014, la vacunación contra el VPH está incluida en el Plan Nacional de Inmunización para niñas que se encuentren cursando cuarto año de Enseñanza Básica.